

دستورالعمل تغذیه ضد تنش درختان میوه در مقابله با سرمازدگی

۱- یک روز قبل از وقوع سرما:

۱-۱- در درختان میوه ای که گلها باز شده اند یا هنوز باز نشده اند (پاپ کورن):

محلول پاشی با ترکیبات اسید آمینه دارای اسید آمینه آزاد بالای ۱۰ درصد و روغن ولک یک درصد (مطابق غلظت توصیه شده بر روی برچسب ترکیبات). نحوه پاشش در گلهایی که باز شده اند، باید به صورت غیر مستقیم به نحوی که سرلانس به صورت میست بر روی تاج درخت پاشیده شود؛ انجام و از پاشش مستقیم خودداری گردد. در درختانی که گلها باز نشده اند (پاپ کورن) پاشش به صورت مستقیم می باشد.

۱-۲- در باغات غیر بارور (نهال):

استفاده از اسید آمینه پتاس بالا و روغن ولک یک درصد (مطابق غلظت توصیه شده بر روی برچسب ترکیبات). به صورت مستقیم به کل نهال پاشیده شود.

۲- یک روز پس از وقوع سرما:

در درختان میوه ای که گلها باز شده اند یا هنوز باز نشده اند (پاپ کورن):

محلول پاشی با ترکیبات اسید آمینه دارای اسید آمینه آزاد ۵ درصد و روغن ولک یک درصد (مطابق غلظت توصیه شده بر روی برچسب ترکیبات). نحوه پاشش در گلهایی که باز شده اند باید به صورت غیر مستقیم به نحوی که سرلانس به صورت میست بر روی تاج درخت پاشیده شود؛ انجام و از پاشش مستقیم خودداری گردد. در درختانی که گلها باز نشده اند (پاپ کورن) پاشش به صورت مستقیم می باشد.